

ງູພິບກັດ

นำเสนอด้วย : 8 ม.ค. 2552

ງພິບກັດ

เมื่อถูกพิษกัด จะปรากฏรอยเขี้ยวเป็น ๒ จุด และมักมีอาการข้องพิษภายใน ๑๐ นาที ถ้าไม่มีพิษ รอยพันบนผิวหนังจะเรียงเป็นแผล อาการของผู้ป่วยที่แสดงออกนั้นสุดแล้ว แต่นิดเดียว เช่น พิษจากงูเหنم กัดทำอันตรายต่อระบบประสาท ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง ผู้ป่วยซึ่งและหายใจลำบาก สวยงามแมวเซาทำอันตรายต่อระบบเลือดและหลอดเลือด มีเลือดไหลลaczอกจากแพลงตอนดเวลา

วิธีปฐมพยาบาล

๑. ให้พิจารณาตรวจสอบว่าถูกงงอะไรกัด ถ้าจับงูได้ให้เก็บไว้นำส่งแพทย์ด้วยเพื่อจะได้เลือกนีดเชรุ่มต้านพิษงูได้ถูกประเภท

๒. ให้ผู้ป่วยนั่งหรือนอน ใช้สายยางหรือพาร์ดแขนหรือขาเหนืออรออยแผลประมาณ ๑ ฝ่ามือ ให้แน่นพอสมควร เพื่อลดอัตราการดูดซึมของพิษที่เข้าสู่ร่างกายโดยกระแสเลือด ควรคลายสายรัดชั่วคราวทุกๆ ๑๐ นาที เพื่อให้เลือดไปเลี้ยงแขนขาส่วนนั้นสักครู่แล้วรัดให้แน่นใหม่

๓. ใช้มีดทึ่ทำควรูสะอดแล้วกรีดเป็นรูปกาบนาทเล็กๆ ลงบนรอยแผลของเขี้ยวงู ผู้ช่วยเหลืออุดเขาเลือดดูออกจากการแผลแล้วบวนทิ้งเสีย ถ้าผู้ป่วยบานอยู่ใกล้โรงพยาบาล สามารถนำไปนีดเชือมตามพิษย์ได้ภายในเวลา ๑ ชั่วโมง ไม่จำเป็นต้องกรีดแผล หรือผู้ป่วยที่ถูกงูกัดมานานเกิน ๑ ชั่วโมง การกรีดและดูด เอาเลือดออกจากการแผลมักไม่ได้ประโยชน์

๔. ทำการพายปอดเมื่อผู้ป่วยหยุดหายใจ หากมีอาการซื้อกันปรมพยาบาลระหว่างนำส่งโรงพยาบาล

๕. หากถูกพิชิตอ่อนๆ กัด หรือถูกไม่มีพิษกัด  
ผู้ป่วยจะมีอาการบวมของผิวหนังเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ไม่ pragmatically การท้าท่าว่าไปที่รุนแรง ควรทำความสะอาดแล้ว  
ให้ยาระงับปวด ไม่จำเป็นต้องฉีดเซรูมดานพิชัย ทั้งนี้อยู่ในการวินิจฉัยของแพทย์