

ปลา...สินสมุทร สรวงฟ้า ของเล่นใหม่ นักเลี้ยงปลาตู้

นำเสนอด้วย : 19 ม.ค. 2553

ปลาสินสมุทรทรวงฟ้า (Pomacanthus annularis) หรือชื่อท้องถิ่นเรียกว่า "ปลาโนราห์" แพร่กระจายพันธุ์อยู่ทั่วไปในเขตอินโด-แปซิฟิก อันดามัน และอ่าวไทย บริเวณที่อาศัยจะเป็นแนวปะการัง หินโสโคริก กองหิน ...

"ภัยธรรมชาติ" เริ่มเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วโลก การณ์ "สีนามิ" ในเมืองไทย แผ่นดินไหว ที่เฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน และเหตุวิบาระค์ที่สาธารณรัฐ "海地" (Haiti) ซึ่งเป็นประเทศหนึ่งในทวีปอเมริกาเหนือ หลายคนเริ่มตั้งคำถามว่า...มันเกิดอะไรขึ้นกับ "โลกกลมๆ" ใบนี้...

...ก่อนที่มนุษย์เราจะมีเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้เป็น "เครื่องมือ" ส่งสัญญาณเตือนภัยคนรุนแรงจะสังเกตธรรมชาติโดยรอบ ทั้งจากลัศจกุลอย่าง ช้าง นา สุนัข ที่มีพฤติกรรมผิดปกติ หากเป็นชาวประมงหรือที่หลายคนเรียกชื่อกันว่า "ชาวเล" ก็จะดูทิศทางลม ท้องฟ้า ผืนน้ำ และการรายเวียนของ "ฟุ่มปลากะพง" ในท้องทะเลที่นับวันเริ่มมีจำนวนลดน้อยถอยลง

ฉะนี้...กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตภัณฑ์ไฮเทค จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดทำโครงการ "สำรวจรถกุตะเหล็ก" ขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการอนุรักษ์ พื้นที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตั้งแต่ระดับทองถิ่นถึงระดับชาติอย่างยั่งยืน

นางสาวอัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บอกกับ "ulatory" ว่า....โครงการดังกล่าวจะสำรวจในพื้นที่ 22 แห่งทั่วประเทศ โดยเริ่มจากชุมชนชาวเลหาดร้าไวย อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยเริ่มจากสังเกตพฤติกรรมปลาต่อการอพยพรวมฝูงหรือหลบซ่อนจากน้ำที่มีอุณหภูมิต่ำมากๆ ของปลาเล็กปลาใหญ่

...ที่บ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ตามลักษณะที่อยู่อาศัยคือ ปลาผิวน้ำ อย่างปลากระโทง เสียด และปลาบินซึ่งกลุ่มนี้จะมีเกล็ดดูบง ดวงไฟ สามารถปรับตัวอยู่ได้ทั้งน้ำอุ่นและน้ำเย็น ปลากลางน้ำ อย่างปลาลัวย ปลาสา กิ้ดังเบ็ด และ ปลาหนานดิน ที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นทะเล อาทิ ปลาแพะ ดูกะเล กะ และปลาสินสมุทรทรวงฟ้า ที่เป็นหนึ่งในจำนวนนี้ด้วยเช่นกัน

สำหรับ ปลาสินสมุทรทรวงฟ้า (Pomacanthus annularis) หรือชื่อท้องถิ่นเรียกว่า "ปลาโนราห์" แพร่กระจายพันธุ์อยู่ทั่วไปในเขตอินโด-แปซิฟิก อันดามัน และอ่าวไทย ซึ่ง บริเวณที่อาศัยจะเป็นแนวปะการัง หินโสโคริก กองหิน ที่ระดับน้ำตื้นถึงน้ำลึก เพื่อหาอาหารได้หลากหลาย ปลาชนิดนี้มีนิสัยดื่นตกใจง่าย แต่หลังปรับตัวได้จะดอนขากราว

ในวัยที่ยังเล็กลักษณะลำตัวจะมีลวดลายบนพื้นลำตัวเป็นขีดสีฟ้าตรงส่วนข้าว ว่ายเวียนอยู่ที่ระดับน้ำตีน 2-3 เมตร พอโตเต็มวัยลำตัวจะเริ่มเปลี่ยนเป็นลายโครงสีฟ้า บนพื้นสีสมอมน้ำตาล มีความยาว 3-12 นิว น้ำหนัก 1 กก. โดยพากมันจะอยู่ด้วยกันเป็นคู หรือฝูงเฉลี่ย 10-20 ตัว

....และถึงแม้วกามันสามารถนำมารู้สำหรับกินอาหารสั่นๆ เรื่องรูปได้ แต่ด้วยเพาะรายเส้นที่สวยงามโดดเด่น อีกทั้งสามารถฝึกให้กินอาหารสั่นๆ เรื่องรูปได้ สองผลใหญ่จุบันกลุมนักเลี้ยงปลาไข่ควาจับมาสายหาง ขยับครึ่บอยู่ในตู้เลี้ยงไปซะแล้ว

ที่มา :: ไทยรัฐ