

ข่าวด่วน.....โรคชิกุน กุญยา สธ. ออกโรง เตือน แนะนำ จ.1

นำเสนอเมื่อ : 24 พ.ค. 2552

ร่วมด้วยช่วยคิด ป้องกันชีวิต ร่วมพิชิตยุงลาย

โรค ชิกุน กุญยา สธ. แนะนำ จ.1



นายวิทยา แก้วภราดัย

สธ.ออกประกาศคำแนะนำประชาชน เผื่อระวังโรคชิกุนกุญยา หลังพบมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ภูมิก่อเกิดมีผู้ป่วยชิกุนกุญยาแลวกว่าพันราย แต่เขาสู่ระบบการรักษาของโรงพยาบาลแค่ 85 ราย เร่งขอความร่วมมือรายขายยาแจ้งข้อมูลผู้ป่วยชื่อยารับประทานเอง เตรียมจัดบักคณินึ่งเคยก้าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

วานนี้ (23 พ.ค.) นายวิทยา แก้วภราดัย รมว.สาธารณสุข เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศคำแนะนำประชาชน เรื่อง โรคไขปวดข้อยุงลาย (Chikungunya)ฉบับที่ 1 เพื่อความร่วมมือในการป้องกันโรคไขปวดข้อยุงลายหลังจากที่โรคไขปวดข้อยุง ลาย ได้แพร่ระบาดในจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทยโดยมียุงลายเป็นพาหะทำให้เกิด โรค สถานการณ์ตั้งแต่ต้นปีจนถึง 19 พ.ค.2552 พบจำนวนผู้ป่วยสะสม 20,541 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างไรก็ตามเพื่อเร่งรัดการเผื่อระวังโรคสกัดกั้น การแพร่ระบาด การป้องกันและควบคุมโรค การดูแลผู้ป่วยการเผยแพร่ความรู้ส่งเสริมบทบาทการป้องกันและควบคุมโรคของ ประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นเพื่อรับมือกับโรคไขปวดข้อยุงลายได้อย่าง มีประสิทธิภาพซึ่งผลการดำเนินงานจะช่วยลดโรคไขเลือดออกกวดวยสำหรับการ ป้องกันควบคุมโรคที่สำคัญ คือ ประชาชน ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของตงมีส่วนร่วมในการป้องกันการติดเชื้อและลด การแพร่ระบาดโรคไขปวดข้อยุงลายกระทรวงสาธารณสุขจึงเนนย้าคำแนะนำประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุขของคกรปกครองสวนท้องถิ่น และสถานศึกษาเพื่อขอความร่วมมือในการป้องกันโรคไขปวดข้อยุงลาย ดังนี้

รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า สำหรับประชาชนทั่วไป ผู้ที่มีอาการไขสูง ร่วมกับอาการปวดข้อหรือออกผื่นให้รีบไปพบแพทย์ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่หรือมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคไขปวดข้อ ยุงลาย ภายใน 2 สัปดาห์ 14จังหวัดทางภาคใต้ ในกรณีที่ยังไม่อาจไปพบแพทย์ได้และมีความจำเป็นต้องรับประทายาแนะนำให้ใช้ ยาพาราเซตามอล ผู้ป่วยโรคไขปวดข้อยุงลายในระยะ 1 สัปดาห์ หลังมีไขควรป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด เพื่อลดการแพร่เชื้อไปสู่บุคคลอื่นโดยนอนในมุงในเวลากลางวันและกลางคืนและ

ไม่ควรเดินทางออกนอกพื้นที่ภายในระยะ 1 สัปดาห์ผู้ที่อาศัยอยู่ร่วมกับผู้ป่วยหรือผู้ที่ไปมาหาสู่อาจมีโอกาสติดเชื้อควรเฝ้าระวังตนเอง 2 สัปดาห์ผู้ที่จำเป็นต้องเข้าไปในสวนยางพาราหรือสวนผลไม้ไม่ควรป้องกันตนเองจากการถูกยุงกัด โดยสวมเสื้อผาแขนยาวขายาวไหม้ติดชิดทากันยุง เป็นต้น นอนในมุ้งหรือห้องที่มุ้งด้วยมุ้งลวดจุดยุงกันยุงแมลงในเวลากลางวันประชาชนทุกคนควรรีวเรือนต้องทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในบ้านและรอบบ้านของตน ทุก 7 วัน โดยเฉพาะภาชนะที่ไม่ได้ใช้รอบๆบ้านไปจนถึงในสวนยางพารา สวนผลไม้ เช่น ยางรถยนต์ ภาชนะที่มีน้ำขัง ใต้ถุนถาวรของน้ำยางพารา กะลามะพร้าว กาบใบไม้ เป็นต้น

นายวิทยา กล่าวอีกว่า ส่วนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ขอให้เฝ้าระวังประชาชนในหมู่บ้านหรือพื้นที่ที่รับผิดชอบหากพบผู้ที่ มีอาการไข้สูง ร่วมกับอาการปวดข้อหรือออกผื่นให้รีบพาไปพบแพทย์และรายงานต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่โดยเร็วสำรวจและรวมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในบ้านและนอกบ้านผู้ป่วยและบ้านเรือนใกล้เคียงและต่อเนื่องถึงพื้นที่สวนใน รัศมี 400 เมตร ให้คำแนะนำและขอความร่วมมือประชาชนในการป้องกันยุงกัดเช่น การใช้มุ้ง ยากันยุง ยาทากันยุงการกำจัดและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และตัวเต็มวัยด้วยตนเองรวมทั้งคำแนะนำในการใช้ยาให้ถูกต้อง ส่วนกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบสถานการณ์วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ป้องกันควบคุมโรคในชุมชน ดำเนินการต่าง ๆ เพื่อลดจำนวนยุงตัวเต็มวัยและแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เช่น ปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมจัดรณรงค์ Big Cleaning Day สัปดาห์ละครั้ง ต่อเนื่อง 3 เดือนออกข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติท้องถิ่น เพื่อให้มีการดูแลกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมตลอดจนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค การควบคุมยุงลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ และลูกน้ำยุงลาย

รุมว.สาธารณสุข กล่าวว่า

ได้ขอความร่วมมือไปยังโรงเรียนและสถานศึกษาให้ดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในสถานศึกษา ทุก 7 วันให้ความรู้และคำแนะนำแก่นักเรียน เกี่ยวกับโรคไขปวดขอยุงลายวงจรชีวิตของยุง การแพร่เชื้อ และวิธีป้องกัน หากพบนักเรียนนักศึกษาที่มีอาการไข้สูงร่วมกับอาการปวดข้อหรือออกผื่นให้รีบพาไปพบแพทย์และแนะนำวิธีปฏิบัติตัวในการป้องกันการแพร่เชื้อหากแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคไขปวดขอยุงลายโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่หรือมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคไขปวดขอยุงลายภายใน 2 สัปดาห์ หากประชาชนต้องการข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข www.moph.go.th และหากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการ กรมควบคุมโรคหมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 3333 และศูนย์บริการข้อมูลฮอตไลน์กระทรวงสาธารณสุข หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1994 ตลอด 24 ชั่วโมง

วันเดียวกันนี้ (23 พ.ค.) น.พ.พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง นายแพทย์สาธารณสุข จ.ภูเก็ต กล่าวถึงการติดตามเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไขหวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 และโรคชิคุนกุนยาที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในขณะนี้ว่า ในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไขหวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 และโรคชิคุนกุนยาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ขณะนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตได้เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคดังกล่าว โดยจะมีการประชุมสรุปสถานการณ์ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เพื่อหาแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของสวนการแพร่ระบาดของโรคชิคุนกุนยา พบผู้ป่วยมีจำนวนเพิ่มขึ้น ขณะนี้พบมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาแล้วจำนวน 85 ราย ทั้งนี้คาดว่า ผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตน่าจะจะมีเป็นพันราย ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล และรักษาตัวเอง โดยการไปคลินิกเอกชนหรือซื้อยารับประทานเอง ทำให้ตัวเลขไม่ชัดเจน ขณะที่การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไขหวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

ในส่วนของจ.ภูเก็ตได้ดำเนินการป้องกันอย่างเข้มงวด โดยมีการติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกนที่บริเวณสนามบิน โดยมีนักท่องเที่ยวผ่านเครื่องกว่า 50,000 คนแล้ว พบผู้ต้องสงสัยเพียง 1 ราย แต่จากการตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่าเป็นหวัดธรรมดาเท่านั้น

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์

ขอบคุณ<http://blog.eduzones.com/futurecareer/25112>