

หนอนคืบ

นำเสนอเมื่อ : 24 มิ.ย. 2551

หนอนคืบ โดย นายชูเกียรติ อธิรัตน์ และ นายภาค โพธิแทน

Semilooper, Family Noctuidae Order Lepidoptera

ถิ่นแพร่ระบาด

แอฟริกา เอเชีย ออสเตรเลีย

ลักษณะของแมลง

ผีเสื้อรูปยาวรี ริมปีกคู่หน้ามีรอยเว้า สีค่อนข้างสดใส โดยมีสีน้ำตาลทองเป็นพื้น และมีริ้วเป็นลูกคลื่น สีน้ำตาลแกดัดตามขวาง ขาวางเดี่ยวๆ บนใบ ขาคู่แรกตอนปลายลำตัวหายไป หนอนจึงงอลำตัวส่วนกลางเพื่อเคลื่อนไหว หัว ลำตัว และขาสี่เขี้ยวอมเหลืองขีด หนอนโตเต็มที่ ยาวประมาณ ๓๐ มิลลิเมตร

การเข้าตักแด

หนอนสร้างรังล้อมระหว่างใบฝ้ายที่ถูกพับหรือระหว่างสมอกับใบเลี้ยง หรือในเศษขยะบนพื้นดิน

ชีวิจักร

ระยะไข่ ๓-๔ วัน

ระยะหนอน ๙-๑๑ วัน

ระยะก่อนเข้าตักแด ๑-๒ วัน

ระยะตักแด ๘-๙ วัน

ผีเสื้ออายุ ๑๘-๓๐ วัน

รวมอายุขัย ๓๙-๕๖ วัน

ผีเสื้อตัวเมียตัวหนึ่งวางไข่ได้ ๑๒-๒๔ ครั้ง จำนวน ๒๔๗-๖๐๗ ฟอง

พืชอาศัย

พืชจำพวกฝ้าย กระเจี๊ยบ ครอบจักรวาล

ศัตรูธรรมชาติ

ตัวเบียน ใต้ตรวจพบมีแมลงวันลาย (Tachinid fly, *Sturmia* sp.)

แตนชาลซิด (Chalcid wasp, *Brachymeria* sp.) แตนอิกนิวโมนิด (Ichneumonid wasp, *Xanthopiimpla punctator*) แตนแบรคอนิด (Braconid wasp, *Apanteles* sp.)

ลักษณะการทำลายและความเสียหาย

หนอนทุกขนาดกัดกินใบฝ้าย ระบาดในระยะเวลาฝ้ายอายุประมาณ ๘๐ วัน กัดกินใบฝ้ายจนเป็นรูพรุนเห็นได้ชัดในไร่ ความเสียหายไม่คอยรุนแรงนัก นอกจากระบาดมากจริงๆ จนกินใบฝ้ายหมดทั้งต้น ก็จะเป็นเหตุให้พืชขาดอาหารในการที่จะส่งไปบำรุงดอกและสมอเช่นเดียวกับหนอนม้วนใบ

บรรณานุกรม

- นายชูเกียรติ อธิรัตน์
- นายภาค โพธิแทน



หนอนคืบ

[ดูภาพทั้งหมดในเรื่องนี้]