

อาการของมะเร็งที่ร้ายแรงต่าง ๆ

นำเสนอเมื่อ : 7 ก.ย. 2551

อาการของมะเร็งที่ร้ายแรงต่าง ๆ

ในระยะแรกมักจะไม่ปรากฏอาการ ต่อมาเมื่อเป็นมากขึ้น (อาจนานเป็นเดือน เป็นปี)

จะมีอาการทั่วไป (พบร่วมกันในมะเร็งทุกชนิด) คือ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ำหนักลด

อย่างรวดเร็ว อาจมีไข้ เหนื่อยง่าย ท้องอืดเฟ้อ คลื่นไส้ อาเจียน ซีด เป็นลม ใจหวิว

คล้ายหิวข้าวบ่อย ส่วนอาการเฉพาะของแต่ละโรค (ซึ่งมักเกิดขึ้นก่อนจะมีอาการทั่วไป)

เกิดจากก้อนมะเร็งไปกดเบียดหรือทำลายอวัยวะที่เป็น พอจะสรุปได้ดังนี้

- มะเร็งผิวหนัง** ส่วนมากจะเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงของไฟ ปาน หรือ จุดด่างกระในคนแก่ โดยมีอาการคันแตกเป็นแผล เจริญไม่ยอมหาย โดยไม่มีอาการเจ็บปวด ต่อมาแผลโตขึ้นเร็ว และมีเลือดออก มีสาเหตุสัมพันธ์กับการถูกแสงแดด (แสงอัลตราไวโอเล็ต) การกินยาที่เบา สารหนู หรือน้ำมันดินที่มีผสมอยู่ในยาจีนยาไทย การสัมผัสสารพิษ สารหนู หรือน้ำมันดิน การระคายเคืองต่อไฟ ปานหรือหูดที่มีอยู่ก่อน
- มะเร็งในช่องปาก** จะมีก้อนหรือแผลเรื้อรังเกิดขึ้นที่ริมฝีปาก เยื่อช่องปาก ลิ้น โดยเริ่มจากฝ้าขาวๆ ที่เรียกว่า ลิวโคพลาเคีย (Leukoplakia) มีสาเหตุสัมพันธ์กับการระคายเคืองเรื้อรัง เช่น กินหมาก จุกยาฉุน ฟันเกหรือใส่ฟันปลอมไม่กระชับ ดื่มเหล้าเข้มข้น (ไม่ผสมเจือจาง) สูบบุหรี่
- มะเร็งที่จมูกและโพรงหลังจมูก** มีอาการเลือดออกทางจมูก หน้าชา คัดจมูก ปวดศีรษะ ต่อมาอาจมีเลือดปนน้ำเหลืองออกทางจมูก หูอื้อ กลืนไม่ไต่ ตาเข ต่อมน้ำเหลืองที่คอโต มะเร็งที่โพรงหลังจมูก มีสาเหตุสัมพันธ์กับการดื่มเหล้าเข้มข้น สูบบุหรี่ การติดเชื้อไวรัสอีบีวี (EBV)
- มะเร็งที่กล่องเสียง** มีอาการเสียงแหบเรื้อรังและอาจมีอาการเจ็บคอ เวลาคลื่นเหื่อนมีทางติดคอต่อมามีเลือดออกปนกับเสมหะ มีสาเหตุสัมพันธ์กับการดื่มเหล้าเข้มข้น การสูบบุหรี่จัด การติดเชื้อไวรัสเอชพีวี
- มะเร็งปอด** มีอาการไอเรื้อรัง น้ำหนักลด ไอออกเป็นเลือดปนเสมหะ มีสาเหตุสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ การสูดควันดำจากท่อไอเสียรถ เขม่าจากโรงงาน สารใยหิน (asbestos) หรือฝุ่นนิกเกิล
- มะเร็งหลอดอาหาร** เริ่มแรกอาจรู้สึกเจ็บเวลากินอาหาร ต่อมากินข้าวสวยไม่ได้ ต่อมากินข้าวต้มไม่ได้ จนในที่สุดกินไม่ได้แต่ของน้ำๆ หรือกลืนอะไรก็ไม่ลงเลย พบมากในผู้ชาย มีสาเหตุสัมพันธ์กับการกินอาหาร และดื่มของร้อนๆ (เช่น น้ำชาร้อน ๆ), การดื่มเหล้าเข้มข้น, การสูบบุหรี่, ภาวะขาดวิตามินเอ เป็นต้น

7. **มะเร็งกระเพาะอาหาร** มีอาการท้องอืด แน่นท้องอยู่เรื่อย เบื่ออาหาร ต่อมาอาจมีอาเจียน คล้ากอนไตที่โตขยายโครงข่าย นำหนักลด ซีด อาเจียนเป็นเลือด ถ่ายดำ มีสาเหตุสัมพันธ์กับการเป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบ จากเชื้อเฮลิโคแบคทีเรีย (H. pylori) แบบเรื้อรัง, การกินอาหารที่มีสารไนเตรดหรือไนโตรซามีน, อาหารเค็มหรืออาหารหมักเกลือ, อาหารประเภทหมักวัน, กรรมพันธุ์, การมีประวัติการผ่าตัดกระเพาะอาหาร เป็นต้น
8. **มะเร็งตับอ่อน** เริ่มแรกอาจมีอาการท้องอืดเพื่อ อาหารไม่ย่อย ต่อมามีอาการปวดท้อง และปวดหลังตีขาน ถ่ายอุจจาระสีซีดขาว เบื่ออาหาร นำหนักลด มีสาเหตุสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ สารไนโตรซามีน สารไฮโดรคาร์บอน การกินอาหารพวกไขมันและโปรตีนสูง และอาจมีสัมพันธ์กับกรรมพันธุ์
9. **มะเร็งลำไส้เล็ก** มักมีอาการปวดท้อง ถ่ายอุจจาระเป็นเลือด หรือถ่ายดำ นำหนักลด เป็นไข้ หรือมีภาวะลำไส้อุดตัน (ปวดท้องรุนแรง อาเจียน) บางรายอาจมีอาการตีขาน ถ่ายอุจจาระสีซีด ขาว อาจคล้ากอนในช่องท้อง อาจมีสาเหตุสัมพันธ์กับการเป็นลำไส้เล็กอักเสบเรื้อรัง
10. **มะเร็งลำไส้ใหญ่** มีอาการท้องผูกสลับกับท้องเดินแบบเรื้อรัง หรือถ่ายเป็นเลือด หรือมูกปนเลือดเรื้อรัง ปวดท้อง ปวดหลัง ซีด นำหนักลด มีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคนี เช่น ภาวะโคเลสเตอรอลในเลือดสูง, การกินอาหารที่มีกากใยน้อย แต่กินพวกไขมันมาก, ประวัติการเป็นมะเร็งในญาติพี่น้อง เป็นต้น
11. **มะเร็งต่อมหน้าเหลือง** จะมีต่อมหน้าเหลืองโตเป็นก้อนที่บริเวณคอ รักแร้ และขาหนีบ อาจมีไข้เรื้อรัง มีสาเหตุสัมพันธ์กับการติดเชื้อไวรัส เอชทีแอลวี-1, เชื้ออีบีวี, เอตส, การได้รับยาเคมีบำบัด หรือรังสีบำบัดมาก่อน เป็นต้น
12. **มะเร็งเต้านม** คล้ากอนที่เต้านม หัวนมบวม (เดิมเป็นปกติ เพิ่งมาบวมตอนหลัง) หรือมีน้ำเหลืองหรือเลือดออกทางหัวนม ต่อมาจะมีต่อมหน้าเหลืองที่รักแร้ข้างเดียวกันโต ผู้หญิงที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคนี เช่น ผู้หญิงที่มีมารดาเป็นมะเร็งเต้านม ก่อนวัยหมดประจำเดือน หรือมีญาติพี่น้องเป็นโรคนีหลังวัยประจำเดือน, ผู้หญิงเกิน 50 ปี ที่ยังไม่มียบุตร, ผู้หญิงที่มีบุตรคนแรกเมื่ออายุเกิน 30 ปี, ผู้หญิงที่มีประวัติเป็นโรคเต้านมเรื้อรัง, คนอ้วน, ผู้ที่สัมผัสรังสี หรือดื่มเหล้า
13. **มะเร็งปากมดลูก** มีเลือดออกเวลาร่วมเพศ มีเลือดออกกะปริดกะปรอยทางช่องคลอด หรือมีตกขาวเรื้อรัง มีสาเหตุสัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชพีวี (HPV/Human papilloma virus) ของปากมดลูกซึ่งเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ร่วมกับปัจจัยเสริมอื่นๆ เช่น การกินยาเม็ดคุมกำเนิด การสูบบุหรี่ เป็นต้น โรคนีพบมากในผู้หญิงที่เริ่มมีเพศสัมพันธ์เมื่ออายุน้อย มีสามีหลายคน หรือมีสามีสำสอนทางเพศ และในหญิงบริการ
14. **มะเร็งอัมพา** พบมีก้อนแข็งที่ถุงอัมพา และโตขึ้นเรื่อยๆ บางครั้งอาจมีอาการปวดร่วมด้วย สาเหตุยังไม่ทราบ พบว่า ผู้ที่มีอัมพาไม่เลื่อนลงถุงอัมพา ซึ่งเป็นมาแต่กำเนิด อาจค้างอยู่ในช่องท้อง หรือขาหนีบ มีโอกาสเป็นมะเร็งอัมพามากขึ้น
15. **มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ** มีอาการปัสสาวะเป็นเลือด ปัสสาวะขัดและบ่อย มีสาเหตุสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ การสัมผัสสารอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (aromatic hydrocarbon) ที่เป็นสารประกอบของสีที่ใช้ทางอุตสาหกรรม, การกินอาหารพวกเนือบึง ย่าง และไขมันมาก
16. **มะเร็งต่อมลูกหมาก** มักไม่มีอาการแสดง จนกระทั่งแพร่กระจายไปยังอวัยวะข้างเคียง ทำให้มีอาการขัดเบา ปัสสาวะลำบาก หรือ ปัสสาวะไม่ออก ปัสสาวะเป็นเลือด ปวดหลังหรือปวดสะโพกนำหนักลด มักพบในคนอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป มีสาเหตุสัมพันธ์กับฮอร์โมนแอนโดรเจน และพบว่าผู้ที่มีประวัติญาติพี่น้องเป็นโรคนี หรือเคยทำหมันชาย มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคนีสูงขึ้น
17. **มะเร็งกระดูก** มีอาการข้อบวม กระดูกบวม บางครั้งพบหลังเกิดอุบัติเหตุ ทำให้เข้าใจว่าเป็นกระดูกหักได้
18. **มะเร็งของลูกตาในเด็ก (Retinoblastoma)** นิยมตำดำของเด็กมีสีขาววาวคล้ายตาแมว เด็กจะบ่นว่าตาขางนั้นมัว หรือมองอะไรไม่เห็น เมื่อเป็นมากขึ้น ตาจะเริ่มปูดโปนออกมานอกเบ้าตา
19. **มะเร็งรังไข่หรือไต** มีอาการมีก้อนในท้อง ท้องมาน ส่วนมะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งตับ มะเร็งในสมอง จะมีอาการแบบเดียวกับเนื้องอกในสมอง มะเร็งต่อมไทรอยด์

ขอบคุณข้อมูลจากยูวเฮลตี้ไกด์ดอทคอม