

อาการแพ้ยา.....สังเกตให้ดีมีวิธีแก้ครับ

นำเสนอเมื่อ : 15 ธ.ค. 2552

วิธีสังเกตอาการ เมื่อแพ้ยา



ภาพประกอบอินเทอร์เน็ต

วิธีสังเกตอาการต่อไปนี้ สามารถนำไปใช้ในกรณีแพ้อาหาร หรือแพ้อาหารอื่นได้ แต่ไม่ทั้งหมด มาดูกันว่าหากคุณแพ้ยา จะทราบได้อย่างไร

- ปรากฏอาการแพ้ทางผิวหนัง เช่น ผื่นแดง ลมพิษ อาการบวมตามเปลือกตา ริมฝีปาก และมือ เท้าบวม เป็นต้น
- ปรากฏอาการแพ้ทางระบบทางเดินหายใจ เช่น หอบ หายใจติดขัด แน่นหน้าอก ไอขัดๆ
- ปรากฏอาการแพ้ทางระบบหัวใจและหลอดเลือด เช่น ความดันโลหิตต่ำ หัวใจเต้นเร็ว
- ปรากฏอาการแพ้ทางระบบทางเดินอาหาร เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย

ส่วนอาการที่พบอื่น ๆ เช่น อ่อนเพลีย ต่อม้ำเหลืองโต บวมตามตัว เป็นต้น ซึ่งความรุนแรงของอาการส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับรูปแบบการไชยา เช่น ยาฉีดจะเห็นผลอาการแพ้ได้เร็วกว่ายากินและยาทา

ทานยาเมื่อไหร่ อย่าลืมสังเกตอาการตัวเองว่ามีการแพ้หรือไม่ ถ้ามีรีบพบแพทย์โดยด่วน