

## การเลี้ยงแมว

นำเสนอเมื่อ : 19 ธ.ค. 2552

### การเลี้ยงแมว

#### แมวออกลูก

3 ตัว

- แมวที่ออกลูกครั้งละ 3 ตัวขึ้นไป หากแม่แมวไม่กินเก่ง หรือแม่แมวไม่อ้วน มีโอกาสที่ลูกแมวจะไม่มีนมกิน และจะตายทั้ง 3 ตัว
- แม่แมวที่พิการ หรือมี 3 ขา อาจจะนอนทับลูกคอกหักได้
- เมื่อแม่แมวออกลูก เพื่อให้แม่แมวมินนมไปเลี้ยงลูกทั้ง 4 ตัว ควรให้กินอาหาร 3 มื้อ และให้กินนมกล่องประมาณ ครึ่งกล่อง และอาจจะให้กินตับไก่ตวยก็ได้ และควรให้กินน้ำที่สะอาด
- ควรเลี้ยงลูกแมวที่เกิดใหม่ไว้ในที่ปลอดภัย อย่าให้แมวนั้นสัมผัสเข้าใกล้ จากประสบการณ์ ผมกำลังดูแมวเกิดใหม่ อยู่ดีๆแมวดูก็กระโดดเข้ามา กัดคอ ลูกแมวตายต่อหน้าผมเลย แมวที่นิสัยดู อาจจะเป็นแมวตัวผู้ หรือแมวตัวเมียที่ทำหมันมานานแล้ว
- คอยสังเกตว่า ลูกแมวตัวไหนดูดนมไม่ทันเพื่อน ให้พยายามดึงแม่วที่ดูดเก่งออกมารอประมาณ 20 นาที แล้วจึงนำกลับไปดูดนมต่อ (อย่าลืมนำแมวดูดนมเก่งกลับไปดูดนมต่อนะครับ เพราะถ้าแม่วที่ดูดนมเก่งไม่ได้ดูดนม อาจจะไม่อดอาหาร และตายในที่สุด แมวจะดูดเก่งก็ตาม) การสังเกตนี้ต้องสังเกตติดต่อกัน 3 เดือนตั้งแต่แรกเกิด ลูกแมวถึงจะไม่ตาย
- การเลี้ยงลูกแมวเกิดใหม่ แม่เลี้ยงผ่านมา 1 เดือนแล้ว ดูแข็งแรงดี แต่หากเราไม่เอาใจใส่ ลูกแมวที่แข็งแรงอาจตายได้ (อันนี้เรื่องจริง) เราต้องเอาใจใส่มันทุกวันและทุกตัว หากสังเกตลูกแมวตัวไหนไม่สบายต้องรีบหาทางแก้ทันที
- ดูแลที่อยู่ที่นอนของลูกแมว อย่าให้เปียกชื้น หรือมีกลิ่นเหม็น ควรให้ลูกแมวนอนในกล่องกระดาษที่ปูเศษผ้าไวพอประมาณ และเปลี่ยนเศษผ้าทุก 2 วัน
- หากลูกแมวหรือแม่แมวเป็นหวัดให้อ่านวิธีแก้ในหัวข้อ โรคของแมว
- ลูกแมวต้องเลี้ยงเกิน 2 เดือนจนกระทั่งตัวโต จึงจะเริ่มให้อาหารได้ ก่อนเริ่มให้อาหาร 1 สัปดาห์ ควรหัดให้เลียน้ำด้วยตัวเองก่อน ในการให้อาหาร อย่านำอาหารที่ขึ้นโต๊ะ เพราะอาจติดคอลูกแมวตายได้ (หลังจากลูกแมวตายผมเห็น ฮีทติ๊ก ไหลออกมาจากคอ ผมไม่น่าป้อน ฮีทติ๊ก มันเลย)
- แม่แมวที่เกิดจะเป็นแมวดำก็อย่ารังเกียจมัน ตอนนั้นผมก็เลี้ยงอยู่ 2 ตัว มันเป็นลูกของไอ้สีสวาด
- ฯลฯ

#### การทำหมันแมว

- ควรนำแมวตัวเมียไปผ่าตัดทำหมัน (เสียเงินประมาณ 600 บาท) อย่าใช้วิธีฉีดยา

แมวที่ฉีดยา(ทุกแบบที่เกี่ยวกับทำหมัน)จะเจตตายภายใน 2 เดือน (จากประสบการณ์)

▪ ควรทำหมันแมวหลังจากแมวออกลูกแล้ว 2 เดือน และก่อนที่มันจะผสมพันธุ์ และไม่ควรมีทำหมันแมวที่ยังเด็ก ควรให้มันเป็นแมวผู้ใหญ่ก่อนแล้วจึงนำไปผ่าตัด

## โรคของแมว

▪ แมวผม 2 ตัวชอบกินเศษอาหาร ขนาดชิ้นราแล้วก็กิน หลังจากนั้นกระเพาะมันก็ติดเชื้อตายไปหนึ่งตัว ตัวที่ 2 เพิ่งจะเริ่มเป็นโรคที่หลังเพราะไม่ตะกละเหมือนตัวแรก ผมรีบพามันไปหาหมอ หมอฉีดยา 3 เข็ม เก็บเงิน 200 บาท แล้วให้พามาอีกหลังจากนั้น 3 วัน และฉีดยาอีกครั้ง พรอมทั้งรับยากินมาใหม่กินอีก 2 สัปดาห์มันจึงหายเป็นปกติ หมอบอกว่าถ้าพามาเร็วก็มีโอกาสหาย แต่ถาปล่อยให้มันเป็นหนักแล้วพามา จะรอดยาก ดังนั้น หากแมวป่วยควรรีบพาไปหาหมอดังแต่วันแรกเลย

▪ โรคหวัดที่เกิดในแมว หากเป็นแมวเด็กหรือแมวผู้ใหญ่ที่อ่อนแอจะมีโอกาสตายสูง หากเราปล่อยให้มันหายเองไม่พาไปหาหมอ ส่วนใหญ่อาการจะหนักขึ้นและตายในที่สุด ไม่มีคำว่าหายเองตามธรรมชาติ (จากวันที่สังเกตเห็นว่ามันเป็นหวัด จนถึงวันที่มันตายเพียง 3 วันเท่านั้น) แต่ถาเป็นแมวอ้วนกินเก่งถึงเป็นหวัดก็ยังกินเก่งเราให้มันกินหญ้ามันก็หายเองได้

สรุปว่า หากพบว่าแมวเป็นหวัด ไม่กินอาหาร ควรรีบพาไปหาสัตวแพทย์ อย่าปล่อยให้มันนาน เพราะโรคหวัดแมว ตายเร็ว

หากแมวที่เป็นหวัดมีขี้ตามากหรือมีหนองจากตาจนลืมตาไม่ได้ ควรหมั่นเช็ดหนองออกจากตาและจมูก และควรพาไปหาสัตวแพทย์

- อาหารสำหรับแมวท้องเสีย คือ ตับไก่ปิ้ง (อันนี้ ไม่แน่ใจ)
- ควรให้แมวกินอาหารให้ตรงเวลา ถ้าแมวอดอาหาร มันจะไม่แข็งแรง และเป็นโรคได้ง่าย
- อย่าให้แมวกินข้าวบูด ควรให้แมวกินข้าวที่คนกินได้ ผมมีประสบการณ์จะเล่าให้ฟัง

แมวเด็กตัวเล็ก ผมปล่อยให้มันกินข้าวบูด หลังจากนั้น มันก็นอนซม ไม่กินข้าว มีน้ำเี่ยมออกจากกัน 2 วัน มันก็ตาย (เป็นอาหารเป็นพิษ ถาพาไปหาหมอดังแต่วันแรก หมอจะรักษาได้)

เย็นวันหนึ่ง ผมนั่งกินขนมเจ เป็นแป้งทอด ผมก็เลยแบ่งให้แมวกินด้วย 1 ชิ้น วันรุ่งขึ้น มันก็นอนซม มีน้ำเี่ยมที่กินเหมือนกัน ผมจึงรีบพาไปหาหมอ หมอบอกว่าอาหารเป็นพิษ รักษาอยู่ประมาณ 1 สัปดาห์ แมวตัวนั้นก็หายเป็นปกติ

ปรกติแมวตัวหลังนี้จะชอบจับหนูแล้วกินหนูด้วย แต่ไม่เคยอาหารเป็นพิษ แต่พอผมเอาขนมแป้งทอดให้กิน มันกลับเป็นอาหารเป็นพิษ ทั้งๆที่ผมก็กินกับมัน

- ฯลฯ

## การรบกวนจากแมว

▪ แมวบางตัวอาจทำให้เพื่อนบ้านรำคาญได้ ตอนกลางคืนควรขังในกรง

▪ อย่าให้แมวสกปรกอยู่ในบ้าน เพราะหากท่านนอนหลับ เวลาตื่นขึ้นมาอาจพบว่า แมวนอนอยู่บนหน้าของท่าน หรือกำลังเลียหน้าของท่าน ทำให้ท่านเป็นโรคได้

▪ หลังจากจับแมว ไม่ควรจับภาชนะบรรจุอาหารหรือน้ำ หรือสิ่งที่จะต้องจับบ่อยๆ เช่น รีโมท และควรล้างมือก่อนกินข้าว เพื่อป้องกันอาหารเป็นพิษ

## นิสัยแมว

▪ แมวเป็นสัตว์ที่มีความต้องการ อย่างบ้านผมจะมีลูกเล็กขุ่นชั้น 2 และแมวจะชอบมุดรูนั้นเข้ามาในบ้าน รูนั้นมุดยากมาก เพราะต้องปีนขึ้นหลังคา แล้วโหนมาตามคาน แล้วจึงมุดรูเข้ามา โดยแมวจะต้องรีดตัวเองเพื่อมุดรูเข้ามา ปัจจุบันแมวตัวนั้นตายแล้ว

เพราะเส้นเอ็นเสีย เนื่องจากมุดเข้ามาบ่อย

เราคิดไปเองว่า ถ้ามันเจ็บเตี้ยว่ามันก็เลิกมุดเอง แต่เนื่องจากมันอยากเข้าบ้าน มันก็จะมุดเข้ามาเรื่อย จนกระทั่งมันเส้นเอ็นเสีย และตายเพราะขยับตัวไม่ได้ จึงทำให้เราคิดว่า แมวมันไม่รู้จักคาดการณ์ว่าอะไรเป็นอันตรายสำหรับมัน เราซึ่งเป็นคนเลี้ยงจะต้องคอยดูแล้วว่ามันทำอะไรที่เป็นอันตรายต่อตัวมันเองหรือเปล่า และพยายามอย่าให้มันทำอย่างนั้น

ในกรณีนี้ ผมควรอุดรูนั้น เพื่อให้มันไม่มุดเข้ามาอีก

### การป้อนยาแมว

- ยาเม็ด

วิธีที่ 1 - แบ่งเป็น 4 ส่วนเล็กๆ แล้วยัดไว้ในตับไก่ย่าง แล้วปล่อยให้แมวกินตับไก่เอง

วิธีที่ 2 - ต้มน้ำเต๋อตุ๋นละลายน้ำตาลให้เป็นน้ำข้นๆ ประมาณ 1 ช้อน แล้วบดยาเม็ดละลายลงไปให้ข้น คนให้เข้ากัน แล้วเอานิ้วจิ้ม ปลายปากแมว แมวจะเลียเองโดยธรรมชาติ

- ยาแค็ปซูล - แกะแค็ปซูลออกแล้วทำตามวิธีที่ 2
- ยาผง - ทำตามวิธีที่ 2
- ยาน้ำ - ถ้าใช้หลอดฉีดยาฉีดเข้าปากมันไม่ได้ ก็ค่อยๆเอานิ้วจิ้มยาไปปลายปากมัน

### การพาแมวไปหาหมอ

▪ เตี้ยนี้ไม่ต้องลำบากแล้ว เพราะสามารถหาซื้อตระกร้าไปใหญ่ๆที่มีฝาปิดล็อคได้แล้ว โดยตระกร้านี้มีรูตลอดทุกด้าน ทำให้แมวมองออกสบายใจ หาซื้อได้ตามทางไกลบ้าน

<http://www.palthai.com/member/cat.htm>