

วิธีปฐมพยาบาล เมื่อของติดคอเด็ก

นำเสนอเมื่อ : 18 ก.ย. 2551

วิธีสังเกตของติดคอเด็ก

- เด็กไม่สามารถส่งเสียงได้ หากของชิ้นนั้นเป็นชิ้นที่มีขนาดใหญ่และไปติดที่หลอดลม หรือหลอดอาหาร ซึ่งเด็กก็ไม่สามารถบอกหรืออธิบายให้ผู้ปกครองทราบได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
- หากเป็นของชิ้นเล็กๆ เด็กจะกลืนอาหารลำบาก สังเกตได้จากการที่เขายืนน้ำลายบ่อยๆ

อันตรายเมื่อของติดคอ

ผลเสียที่เกิดขึ้นกับลูกเมื่อมีอะไรเข้าไปติดในลำคอ คือทำให้กลืนอาหารลำบาก โดยเฉพาะเด็กที่มีหลอดอาหารขนาดเล็กคะ บางคนอาจไม่สามารถกลืนอาหารได้เลย ที่สำคัญ หากของชิ้นนั้นมีคม จะทำให้เกิดบาดแผลบริเวณลำคอ ได้ และยังมีเชื้อโรคปนเปื้อนได้ ซึ่งหากเกิดแผลในหลอดอาหารก็มีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นฝี และลุกลามไปถึงหัวใจ ทำให้เสียชีวิตได้

วิธีปฐมพยาบาลเมื่อมีของติดคอลลูก

ให้ลูกนั่ง โดยให้ศีรษะต่ำกว่าหน้าอก ใช้มือข้างที่ถนัดพยุงศีรษะเอาไว้ ส่วนมืออีกข้างให้ใช้ฝ่ามือกระแทกบริเวณสะดือทั้งสองข้าง 4 ครั้ง ทำเช่นเดียวกับการช่วยเหลือเด็กเล็ก แต่ถ้ายังไม่ออก ให้ยื่นคอรอมหลังเด็กกำมือให้นิ้วโป้ง อยู่บนท้องระหว่างบั้นเอวกับลิ้นปี่ แล้วใช้มืออีกข้างทำกำปั้น กระแทกเร็วๆ 4 ครั้งให้ตรงจุด

ถ้าปฏิบัติเบื้องต้นตามที่กล่าวมาแล้วยังไม่ได้ผล ก็รีบนำลูกส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดคะ สิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดแล้ว พ่อแม่ต้องมีความสามารถในการดูแลลูกๆ เพื่อที่จะไม่เกิดเรื่องแบบนี้

ที่มา <http://women.sanook.com>