

## อ่านแล้วบอกต่อ

นำเสนอเมื่อ : 23 ธ.ค. 2551

วิธีสังเกตอาการเส้นเลือดแตกในสมองคร่าวๆ

มีเพื่อนคนหนึ่ง หกล้ม ในงานบวชปีคิวปาร์ตี้ เพื่อนในงานแนะนำให้ไปหาหมอ แต่เจ้าตัวบอกว่าไม่เป็นไร เพียงแต่ใส่รองเท้าใหม่แล้วสะดุดเท่านั้น

อิงอิงยืนไม่ค่อยมั่นคง เพื่อนๆ ช่วยปัดเป่าเสื้อผ้าให้ แล้วยกอาหารจานใหม่ให้ร่วมสนุกกันต่อ หลังจากนั้น ผู้สามีแจ้งมาว่า อิงอิงถูกส่งเข้าโรงพยาบาล แต่แล้วก็เสียชีวิตตอน 6 โมงเย็น

ถ้าหากเพื่อนๆ รู้จักวินิจฉัยอาการโรค ป่านนี้อิงอิงอาจยังมีชีวิตอยู่กับเพื่อนๆ

บางคนเส้นโลหิตในสมองแตก อาจไม่ตาย แต่ก็อาจเป็น อัมพฤกษ์หรืออัมพาต

แพทย์ทางประสาทวิทยาบอกว่า หากผู้ป่วยถึงมือแพทย์ภายใน 3 ชม. ก็จะมีโอกาสรอด

วิธีวินิจฉัยอาการ

ถ้าคนข้างเคียงไม่รู้จักรับวินิจฉัยอาการ สมองผู้ป่วยก็จะถูกทำลายอย่างร้ายแรง

แพทย์แนะนำ คนข้างเคียงเพียงแค่ทดสอบผู้ป่วยด้วย 3 ข้อ ก็สามารถวินิจฉัยอาการได้

โปรดจำเคล็ดลับ STR ดังต่อไปนี้

S:(smile) -> ให้ผู้ป่วยยิ้ม

T:(talk) -> ให้ผู้ป่วยพูดประโยคที่มีสระสมบุรณ์ เช่น วันนี้อากาศสดใสจัง

R:(raise) -> ให้ผู้ป่วย( ยก)ชูแขนสองข้างขึ้น

อาการอีกอย่างที่ไม่ควรมองข้าม ให้ผู้ป่วยแลบลิ้นออก ถ้าลิ้นม้วนหรือเบี้ยวไปข้างหนึ่ง

ใช่แล้ว สอ! อาการอันตราย

ถ้าผู้ป่วยมีอาการผิดปกติข้อใดข้อหนึ่ง ให้รีบแจ้ง 1669 และเล่าอาการให้ผู้รับสายฟัง

โปรดส่งข้อความนี้ต่อให้เพื่อนๆ ของท่านทราบด้วยอย่างน้อยสัก 10 คน เพื่อเป็นความรู้ที่อาจช่วยชีวิตผู้อื่นได้