

วิธีปฐมพยาบาลบาดแผลจากสัตว์มีพิษกัดต่อย

นำเสนอเมื่อ : 22 ม.ค. 2552

สัตว์มีพิษที่กัดต่อยนั้นมีหลายชนิด ตั้งแต่สัตว์เล็กไปจนถึงสัตว์ใหญ่ และมีพิษแตกต่างกันออกไป เช่น แมงป่อง ผึ้ง แมงมุม งู สุนัข ฯลฯ ซึ่งถ้าหากถูกสัตว์มีพิษเหล่านี้กัดต่อยแล้วอาจถึงแก่ชีวิตได้ อันตรายจากการถูกสัตว์มีพิษกัดต่อยที่สำคัญ ได้แก่

1. แผลถูกงูกัด การถูกงูพิษกัด อาจมีอาการแตกต่างกันไปตามชนิดของงูพิษ ซึ่งมีอาการเกิด ขึ้นได้ 3 ทางคือ
 - พิษต่อประสาท เช่น งูเห่า งูจงอาง ทำให้ เกิดอัมพาตของกล้ามเนื้อ และที่สำคัญทำให้หยุดหายใจ
 - พิษต่อโลหิต เช่น งูแมวเซา งูกะปะ และ งูเขียวหางไหม้ ทำให้เลือดออกตามที่ต่างๆ เช่น ผิวหนัง ปัสสาวะเป็นเลือด อาเจียนเป็นเลือด เป็นต้น
 - พิษต่อกล้ามเนื้อ เช่น งูทะเล ทำอันตรายต่อเซลล์กล้ามเนื้อ ทำให้มีอาการปวดกล้ามเนื้อมาก และอาจตายปัสสาวะเป็นสีดำได้
2. **การปฐมพยาบาลแผลถูกงูกัด** ปฏิบัติได้ดังนี้
 - รััดบริเวณเหนือแผลให้แน่นด้วยสายยาง เชือก หรือผ้าก็๊ต โดยรััดระหว่างแผลกับหัวใจ
 - พยายามอย่าให้ผู้ป่วยหลับ
 - ห้ามไชยากระตุ้นหัวใจเป็นอันขาด เพราะจะทำให้พิษเข้าสู่หัวใจเร็วขึ้น
 - รัับนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันที และถ้าสามารถบอกชนิดของงูที่กัดได้ก็จะยิ่งดี เพื่อสะดวกในการฉีดเซรุ่มแก้พิษงู
3. แผลถูกแมงป่องต่อย ตะขาบและแมงมุมกัด บาดแผลพวกนี้จะทำให้เกิดอาการปวดและบวมมาก บางคนอาจแพ้พิษมากก็จะทำให้มีไข้ คลื่นไส้ อาเจียน เนื่องจากพิษถูกดูดซึมเข้ากระแสโลหิต **การปฐมพยาบาลแผลถูกแมงป่องต่อย ตะขาบหรือแมงมุมกัด** ปฏิบัติได้ดังนี้
 - ถ้าถูกกัดหรือต่อยบริเวณข้อมือหรือนิ้วเท้า ให้ไชผ้าหรือสายยางรััดตรงโคนนิ้ว ถ้าเป็นแขนหรือขาให้รััดเหนือแผลประมาณ 5 นาที จึงคลายออก
 - ดูดูเอาพิษออก หรืออาจไชเหล็กเผาไฟจี้ใสแผล หรืออาจผ่าแผลให้กว้าง แล้วไชเกลือต่างทับทิมใส่เข้าไป
 - ไช้นำแข็งวางบริเวณที่ถูกกัดหรือต่อย ประมาณ 2 ชั่วโมง แขนหรือขาข้างที่ถูกกัดหรือต่อย ควรจะวางต่ำกว่าส่วนอื่นของร่างกาย
 - บริเวณที่ถูกกัดให้ล้างด้วยด่างทับทิม
 - ถ้ามีเหล็กไนติดอยู่ให้คีบออกแล้วทาด้วยแอมโมเนีย โซดาไปคาร์บอเนต น้ำเกลือหรือน้ำปูนใส
4. แผลจากผึ้ง แตน ต่อ และแมลงกัดต่อย ผึ้ง แตน และต่อเป็นแมลงที่มีเหล็กไน เมื่อต่อยแล้วจะคายเหล็กไนไว้ พิษของแมลงพวกนี้จะมีฤทธิ์เป็นกรด ซึ่งแผลที่ถูกต่อยนั้นจะคันและมีอาการบวมแดง ถ้าถูกต่อยมากๆ เช่น ผึ้งเป็นจำนวนมากต่อยก็จะมีอาการดังนี้ คือ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน เป็นลมหมดสติ และอาจถึงแก่ชีวิตได้

การปฐมพยาบาลจากผึ้ง แตน ต่อ และแมลงกัดต่อย ปฏิบัติได้ดังนี้

1. ให้รัับเอาเหล็กไนออกจากแผลทันที โดยใช้ลูกกัญแจชนิดที่มีรูตรงปลายกดลงที่ตรงแผลนั้น เหล็กไนจะไพล่ออกมาซึ่งสามารถคีบออกได้
2. ไช้สุลีสูบแอมโมเนียทาบริเวณแผล หรืออาจไชน้ำยาที่เป็นด่างอ่อนๆ เช่น โซดาไปคาร์บอเนต หรือน้ำปูนใสก็ได้
3. ไช้นำแข็งประคบบริเวณแผล เพื่อรัับอาการปวดและช่วยลดการรัซึมซาบของพิษ
4. ถ้าหากถูกต่อยบริเวณหน้า คอ แล้วมีอาการบวมหายใจไม่ออก ให้รัับนำส่ง โรงพยาบาลเพื่อรัับการรักษาโดยด่วน