

## วิธีปฐมพยาบาลบาดแผลจากสัตว์มีพิษกัดต่อย

นำเสนอเมื่อ : 22 ม.ค. 2552

สัตว์มีพิษที่กัดต่อยนั้นมีหลายชนิด ตั้งแต่สัตว์เล็กไปจนถึงสัตว์ใหญ่ และมีพิษแตกต่างกันออกไป เช่น แมงป่อง ผึ้ง แมงมุม งู สุนัข ฯลฯ ซึ่งถ้าหากถูกสัตว์มีพิษเหล่านี้กัดต่อยแล้วอาจถึงแก่ชีวิตได้ อันตรายจากการถูกสัตว์มีพิษกัดต่อยที่สำคัญ ได้แก่

1. แผลถูกงูกัด การถูกงูพิษกัด อาจมีอาการแตกต่างกันไปตามชนิดของงูพิษ ซึ่งมีอาการเกิด ขึ้นได้ 3 ทางคือ
  - พิษต่อประสาท เช่น งูเห่า งูจงอาง ทำให้ เกิดอัมพาตของกล้ามเนื้อ และที่สำคัญทำให้หยุดหายใจ
  - พิษต่อโลหิต เช่น งูแมวเซา งูกะปะ และ งูเขียวหางไหม้ ทำให้เลือดออกตามที่ต่างๆ เช่น ผิวหนัง ปัสสาวะเป็นเลือด อาเจียนเป็นเลือด เป็นต้น
  - พิษต่อกล้ามเนื้อ เช่น งูทะเล ทำอันตรายต่อเซลล์กล้ามเนื้อ ทำให้มีอาการปวดกล้ามเนื้อมาก และอาจตายปัสสาวะเป็นสีดำได้
2. **การปฐมพยาบาลแผลถูกงูกัด** ปฏิบัติได้ดังนี้
  - รััดบริเวณเหนือแผลให้แน่นด้วยสายยาง เชือก หรือผ้าก็๊ต โดยรััดระหว่างแผลกับหัวใจ
  - พยายามอย่าให้ผู้ป่วยหลับ
  - ห้ามไชยากระตุ้นหัวใจเป็นอันขาด เพราะจะทำให้พิษเข้าสู่หัวใจเร็วขึ้น
  - รัับนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันที และถ้าสามารถบอกชนิดของงูที่กัดได้ก็จะยิ่งดี เพื่อสะดวกในการฉีดเซรุ่มแก้พิษงู
3. แผลถูกแมงป่องต่อย ตะขาบและแมงมุมกัด บาดแผลพวกนี้จะทำให้เกิดอาการปวดและบวมมาก บางคนอาจแพ้พิษมากก็จะทำให้มีไข้ คลื่นไส้ อาเจียน เนื่องจากพิษถูกดูดซึมเข้ากระแสโลหิต **การปฐมพยาบาลแผลถูกแมงป่องต่อย ตะขาบหรือแมงมุมกัด** ปฏิบัติได้ดังนี้
  - ถ้าถูกกัดหรือต่อยบริเวณข้อมือหรือนิ้วเท้า ให้ไชผ้าหรือสายยางรััดตรงโคนนิ้ว ถ้าเป็นแขนหรือขาให้รััดเหนือแผลประมาณ 5 นาที จึงคลายออก
  - ดูดูเอาพิษออก หรืออาจไชเหล็กเผาไฟจี้ใส่แผล หรืออาจผ่าแผลให้กว้าง แล้วไชเกลือล้างที่บวมใส่เข้าไป
  - ไช้นำแข็งวางบริเวณที่ถูกกัดหรือต่อย ประมาณ 2 ชั่วโมง แขนหรือขาข้างที่ถูกกัดหรือต่อย ควรจะวางต่ำกว่าส่วนอื่นของร่างกาย
  - บริเวณที่ถูกกัดให้ล้างด้วยด่างทับทิม
  - ถ้ามีเหล็กไนติดอยู่ให้คีบออกแล้วทาด้วยแอมโมเนีย โซดาไปคาร์บอเนต น้ำเกลือหรือน้ำปูนใส
4. แผลจากผึ้ง แตน ต่อ และแมลงกัดต่อย ผึ้ง แตน และต่อเป็นแมลงที่มีเหล็กไน เมื่อต่อยแล้วจะคายเหล็กไนไว้ พิษของแมลงพวกนี้จะมีฤทธิ์เป็นกรด ซึ่งแผลที่ถูกต่อยนั้นจะคันและมีอาการบวมแดง ถ้าถูกต่อยมากๆ เช่น ผึ้งเป็นจำนวนมากต่อยก็จะมีอาการดังนี้ คือ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน เป็นลมหมดสติ และอาจถึงแก่ชีวิตได้

### **การปฐมพยาบาลจากผึ้ง แตน ต่อ และแมลงกัดต่อย** ปฏิบัติได้ดังนี้

1. ให้รัับเอาเหล็กไนออกจากแผลทันที โดยใช้ลูกกัญแจชนิดที่มีรูตรงปลายกดลงที่ตรงแผลนั้น เหล็กไนจะไพล่ออกมาซึ่งสามารถคีบออกได้
2. ไช้สุลีสูบแอมโมเนียทาบริเวณแผล หรืออาจไชน้ำยาที่เป็นด่างอ่อนๆ เช่น โซดาไปคาร์บอเนต หรือน้ำปูนใสก็ได้
3. ไช้นำแข็งประคบบริเวณแผล เพื่อรัับระงับอาการปวดและช่วยลดการรัซึมซาบของพิษ
4. ถ้าหากถูกต่อยบริเวณหน้า คอ แล้วมีอาการบวมหายใจไม่ออก ให้รัับนำส่ง โรงพยาบาลเพื่อรัับการรักษาโดยด่วน