

เห็บออกโรค

นำเสนอเมื่อ : 19 ก.พ. 2552

เห็บออกโรค (twenty four – seven magazine)

เห็บจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อร่างกายสัมผัสกับสิ่งกระตุ้น 2 อย่าง คือ ความร้อน และอารมณ์
ในทางการแพทย์ระบุว่า เห็บสามารถบ่งบอกอาการของโรค บางชนิดได้ โรคที่สัมพันธ์กับเห็บมี 2 ประเภท คือ

1. โรคที่ทำให้เห็บออกมาก

- เครียด เห็บจะออกมากบริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า รักแร้ และหน้าผาก ประกอบกับมีอาการอื่นร่วม เช่น
ชีพจรเต้นเร็ว ใจสั่น มือสั่น

- ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ หรือคอพอก เห็บจะซีมออกมาทั่วตัว โดยเฉพาะบริเวณฝ่ามือทั้งสองข้าง
ร่วมกับมีอาการซีหุดหงิด มือสั่น ชีตอกใจ น้ำหนักลด ตาโปน ผอมวrung เหงื่ออຍาย ใจสั่น หิวนำบอຍ โรคหัวใจ
เห็บออก รวมกับใจสั่น เหงื่ออຍหอบ ขณะออกกำลังกาย หากมีอาการแน่นที่คอและหน้าอก
เห็บออกตามนิ้วมือนิ้วเท้าทุกครั้งทีออกกำลังกาย มีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจสูง

2. โรคที่ทำให้เห็บออกน้อย

- โรคผิวหนัง เช่น ผด ผื่น สะเก็ดเงิน ผิวแห้งแตกหยาบ
เนื่องจากต่อมเห็บไต่ผิวหนังถูกกดไวจนไม่สามารถขับเห็บได้ตามปกติ
ทำให้เกิดอาการอุดตันในขุมขนและเป็นโรคไตในที่สุด

- ไมเกรน คนทีมีความเครียดเป็นทุนเดิม ชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติ หากร่างกาย
ได้รับการกระตุ้นจนเกิดความร้อนสะสมแต่กลับไม่มีเห็บออกมา อาจทำให้ใจสั่น นอนไม่หลับ
เกิดภาวะปวดศีรษะอย่างรุนแรงจนเป็นไมเกรน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

