

เส้นเลือดขาด และเส้นเลือดฝอยที่ขาแตก มีอันตรายมากน้อยแค่ไหน

นำเสนอเมื่อ : 24 มี.ค. 2552

เส้นเลือดขาด เกิดจากความผิดปกติของลิ้น (Valve) เล็กๆ ในหลอดเลือดดำ ไม่สามารถสกัดกั้นการไหลย้อนของเลือดได้ จึงทำให้เลือดเกิดการคั่งอยู่ในหลอดเลือดส่วนปลาย ได้แก่ส่วนที่อยู่ไกลผิวหนังทำให้เห็นเป็นเส้นเลือดที่โป่งพองเป็นก้อน หรือเป็นเส้นเลือดฝอยแตกกระจายแผ่นที่หรือใยแมงมุม

การรักษาเส้นเลือดขาดในอดีตที่ผ่านมา ทำได้โดยการผ่าตัดเพียงอย่างเดียว แต่ปัจจุบันวงการแพทย์เมืองไทยได้มีวิวัฒนาการใหม่ ๆ ในการรักษาเส้นเลือดขาดโดยไม่ต้องผ่าตัด ซึ่งเป็นการรักษาที่ได้ผลดีกับเส้นเลือดดำที่แตกแขนง และสามารถมองเห็นได้ชัดเจนโดยแพทย์จะฉีดน้ำเกลือเข้าไปสร้างความตึงตัวให้กับผนังเส้นเลือด ทำให้เส้นเลือดขาดหดตัวลงได้ โดยทั่วไปจะใช้ในการรักษาเส้นเลือดขาดบริเวณขา บริเวณแขน มือ ใบหน้า และบริเวณลำตัวก็รักษาได้เช่นกัน

ข้อมูลเพิ่มเติมดูที่นี่

<http://www.prd.go.th/Article/beautiful.php?id=c12c7&bow=00000000473&code=c12c7>