

"ยาเสียสาว" คืออะไร? ต้องป้องกันตัวอย่างไร?

นำเสนอเมื่อ : 11 พ.ค. 2565

เราอาจจะเคยได้ยินถึงชื่อ ยาเสียสาว กันมาบ้างแล้วจากข่าวในปัจจุบันและการเตือนภัยสังคม แต่อาจไม่รู้ว่ ยาเสียสาวหมายถึงยาใด หรือยังไม่เข้าใจว่ยาเสียสาวมีอันตรายมากน้อยเพียงใด วันนี้ ครัวบ้านชอกดอทคอม ได้นำข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มาฝากกัน

ยาเสียสาว คืออะไร?

ยาเสียสาว ในที่นี้ คือ **สารเคมีที่ถูกนำมาใช้ในทางที่ผิด** โดยผู้ประสงค์ร้ายแอบลักลอบใช้กับเหยื่อหวังก่ออาชญากรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเพื่อรูดทรัพย์ หรือลวงละเมิดทางเพศ โดยมักใช้สารเคมี ดังต่อไปนี้

- ยามิดาโซแลม (Midazolam) หรือชื่อการค้า โดมิจุม (Dormicum)
- ยาอัลปราโซแลม (Alprazolam)
- ยาฟลูไนตราเซปแอม (Flunitrazepam) หรือชื่อการค้า โรฮิบนอล (Rohypnol)
- สารจีเอชบี (GHB = gamma-hydroxybutyrate)
- ยาเค หรือ เคตามีน (ketamine)

คุณสมบัติที่ทำให้ยาหรือสารเคมีเหล่านี้ถูกนำมาใช้ในทางที่ผิด

1. ผลของยาที่ทำให้เกิดอาการมึนงง ง่วงซึม ไม่มีสติ หรือสลบไปได้ รวมถึงยาบางตัวมีฤทธิ์คล้ายกัญวลหรือทำให้รู้สึกเคลิ้มสุขคล้ายการดื่มแอลกอฮอล์
2. ออกฤทธิ์ได้รวดเร็ว ไม่เกิน 30 นาที หลังจากรับประทานยา
3. สามารถละลายได้ดีในน้ำ ทำให้มีการนำยาเหล่านี้ไปละลายในเครื่องดื่มต่าง ๆ ให้คนดื่มไปโดยที่ไม่รู้ว่มีการผสมยาลงไป ซึ่งหากใส่ไปในเครื่องดื่มพวกแอลกอฮอล์จะยิ่งเพิ่มการออกฤทธิ์ของยาเหล่านี้
4. มีผลข้างเคียงทำให้เกิดอาการสูญเสียความทรงจำไปชั่วขณะ จึงอาจทำให้เหยื่อไม่สามารถจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้

ยาเหล่านี้อาจเกิดอันตรายถึงชีวิตหากใช้เกินขนาด

เนื่องจากมีฤทธิ์การกดการหายใจ จนเกิดอาการโคม่าเสียชีวิตได้ ดังนั้นเราควรระมัดระวังตัว และเรียนรู้วิธีการที่จะป้องกันตนเอง ไม่ดื่มเครื่องดื่มหรือรับประทานอาหารจากคนแปลกหน้า โดยเฉพาะหากอยู่ในสถานที่ไม่หนาไว้วางใจ

อาการเมื่อโดนยาเสียสาว

โดยมีอาการเตือนที่บ่งบอกว่าอาจได้รับสารเหล่านี้ ดังนี้

- อาการคลื่นไส้ อาเจียน
- มีนงง
- เดินเซ
- หายใจลำบาก
- มีอาการคล้ายเมาสุรา แม้ไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์ หรือดื่มไปเพียงเล็กน้อยจริง ๆ

วิธีป้องกันตัวเองจากยาเสี่ยสาว

1. เมื่อทานอาหาร หรือดื่มเครื่องดื่ม ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตาม
ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มหรือรับประทานอาหารจากคนแปลกหน้า โดยเฉพาะหากอยู่ในสถานที่ไม่น่าไว้วางใจ
2. หากวางอาหาร หรือเครื่องดื่มของตนเองเอาไว้บนโต๊ะ แล้วขอตัวเข้าห้องน้ำ
เมื่อกลับมาที่โต๊ะควรเปลี่ยนแก้วเครื่องดื่มใหม่ และไม่ทานอาหารจานนั้นต่อ
3. แม้ว่าจะอยู่กับเพื่อนสนิท แต่ไม่ควรไว้วางใจใครทั้งนั้น ระวังเครื่องดื่ม
และอาหารการกินเมื่อต้องทานกับคนแปลกหน้าเสมอ แม้ว่าเขาคงจะทานอาหาร
หรือดื่มเครื่องดื่มในแก้วนั้นเพื่อพิสูจน์ว่าไม่ได้ใส่ยาก็ตาม
4. หากรู้ตัวว่าทานยาเสี่ยสาวเข้าไป ควรรีบตั้งสติหนีออกมาจากสถานที่เกิดเหตุ โทรศัพท์หาคนในครอบครัว
แจ้งสถานที่อยู่ปัจจุบันให้ชัดเจน และหากหาตัวนำเปลาไตก็ควรรีบดื่มให้เร็วที่สุด
จะช่วยเจือจางยาที่เพิ่งทานเข้าไปได้

อย่างไรก็ตาม ยาเหล่านี้ไม่สามารถหาซื้อได้ทั่วไป

เนื่องจากเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภทที่มีการควบคุมการซื้อขาย
แต่ในปัจจุบันพบว่ามีการลักลอบนำมาขายผิดกฎหมายโดยเฉพาะทางอินเทอร์เน็ต
หากพบเห็นมาช่วยกันแจ้งเบาะแสกับทาง ออย. ได้ที่สายด่วน ออย. 1556

ภัยร้ายสังคม รู้เท่าทัน ยาเสียสาว



ยาเสียสาว คือ สารเคมีที่ถูกนำมาใช้ในทางที่ผิด โดยผู้ประสงค์ร้ายแอบลักลอบใช้กับเหยื่อหวังก่ออาชญากรรม ไม่ว่าจะเพื่อรูดทรัพย์ หรือล่องละเมิดทางเพศ



สารที่มักนำมาใช้

- ยามิดาโซแลม (Midazolam) หรือโดมิกุม (Dormicum)
- ยาอัลปราโซแลม (Alprazolam)
- ยาฟลูไนตราซีแพม (Flunitrazepam) หรือโรฮิปนอล (Rohypnol)
- ยาเคต หรือ เคตามีน (Ketamine)
- สารจีเอชบี (GHB = gamma-hydroxybutyrate)

คุณสมบัติที่ทำให้ยาเหล่านี้ถูกนำมาใช้ในทางที่ผิด



ผลของยาที่ทำให้เกิดอาการ มึนงง ง่วงซึม ไม่มีสติ หรือสลบได้ รวมถึงทำให้รู้สึกเคลิ้มสุขคล้ายดื่มแอลกอฮอล์



ออกฤทธิ์ได้รวดเร็ว ไม่เกิน 30 นาที หลังจากรับประทานยา



สามารถละลายได้ดีในน้ำ ทำให้มีการนำยาเหล่านี้ไปละลายในเครื่องดื่มต่าง ๆ ให้คนดื่มโดยไม่รู้ตัว



ผลข้างเคียงทำให้เกิดอาการสูญเสียความทรงจำไปชั่วขณะ จึงอาจทำให้เหยื่อไม่สามารถจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้

ยาเหล่านี้อันตรายถึงชีวิตหากใช้เกินขนาด เนื่องจากมีฤทธิ์การกดการหายใจ จนเกิดอาการโคม่าเสียชีวิตได้

การป้องกันตนเอง



ไม่ดื่มเครื่องดื่มหรือรับประทานอาหารจากคนแปลกหน้า โดยเฉพาะหากอยู่ในสถานที่ไม่น่าไว้วางใจ



อาการเตือนที่บ่งบอกว่าอาจได้รับสารเหล่านี้ อาการคลื่นไส้ อาเจียน มึนงง เต้นเซ หายใจลำบาก มีอาการคล้ายเมาสุรา แม้ไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์ หรือดื่มไปเพียงเล็กน้อย

จริง ๆ แล้วสารเหล่านี้ไม่สามารถหาซื้อได้ทั่วไปแต่มีการลักลอบนำมาขายผิดกฎหมาย โดยเฉพาะทางอินเทอร์เน็ต หากพบเห็นมาช่วยกันแจ้งเบาะแสกับทาง ออย. ได้ที่สายด่วน ออย. 1556

ขอบคุณข้อมูลจาก [สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา](#)